



藥物成分	劑型	櫃號
Lidocaine / Prilocaine	外用 噴霧	
版本：TPE202309／檔號：2023-275		

☞ 藥品商品名及含量

賦久勁外用噴霧劑 150 毫克/50 毫克/毫升 (Fortacin cutaneous spray)。

☞ 藥品作用

治療成年男性之原發性早發性射精。

☞ 使用方式

1. 首次使用前應短暫搖晃噴霧器、然後朝空中噴 3 次，以完成準備作業；往後每次使用前，應短暫搖晃噴霧器。
2. 每次按 3 下使藥劑覆蓋於龜頭；24 小時內最多可給予 3 劑(1 劑等於按 3 下)，每 1 劑相隔至少 4 小時。
3. 於性交前五分鐘，直立拿著藥罐(氣閥朝上)時以不同角度按下氣閥 3 次噴在龜頭處(龜頭應完全退去包皮)，性交前再擦掉多餘藥液，便能降低龜頭敏感度。
4. 請依照醫師指示使用，不可自行調整劑量或增加使用次數。若不慎忘記，請立即補用，但若已接近下一次用藥時間，在下次用藥時間使用即可，不可為了補用而使用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是葡萄糖-6-磷酸脫氫酶缺乏症，或先天性或特發性變性血紅素血症者，以及對醃胺類局部麻醉劑過敏者。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是第三類抗心律不整藥品 (如 amiodarone)。
3. 本品只能施用於龜頭，若不慎接觸眼睛，可能引起眼部刺激，請立即以水或氯化鈉溶液清洗眼睛，並保護眼睛直到感覺恢復為止。
4. 常見副作用為生殖器感覺減弱、男性勃起功能障礙、女性

陰戶陰道灼熱感，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。

5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：重度神經學症狀(抽搐、中樞神經系統抑制)。
6. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中未指出生殖毒性。最好避免在懷孕期間使用本藥，除非已採取有效的男性屏障避孕措施以防止可能的胎兒暴露。
7. 本藥可分泌至人類乳汁，不過本藥在治療用劑量下，活性物質由男性病人轉移至女性伴侶身上，不預期會對喝母乳的新生兒/嬰兒造成影響。
8. 搭配男用保險套時，勃起障礙和男性生殖器感覺減弱的發生率可能提高。
9. 搭配含聚氨酯的女用和男用保險套時，過去曾觀察到保險套變質。