



藥物成分

劑型

櫃號

Rifabutin

口服藥

版本：TPE202309／櫃號：2023-374

## ☞ 藥品商品名及含量

淨核膠囊 150 毫克/膠囊 (Mycobutin)

## ☞ 藥品作用

治療肺結核、預防或降低免疫抑制病人之禽結核分枝桿菌感染。本藥尚有其他臨床用途，請詢問您的醫師或藥師。


## ☞ 服用方式

1. 通常每天 1-2 次，飯前 1 小時或飯後 2 小時空腹服用，每次 1-4 粒。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是對 Rifamycin 類藥物過敏史、血液疾病、結核病、肝功能障礙。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗反轉錄病毒藥物、口服避孕藥。
3. 本藥會降低口服避孕藥藥效，服藥期間請採取其他避孕方式。
4. 會使尿液、皮膚與人體分泌物呈橘紅色。
5. 隱形眼鏡可能永久染色，尤其是軟性隱形眼鏡。
6. 常見副作用為皮膚癢，噁心、嘔吐等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
7. 如果有下列症狀，請立刻就醫：嚴重腹瀉、史蒂文生強生症候群(皮膚紅疹或嘴破，且合併類流感的症狀，像是發燒、顫抖、肌痛或噁心嘔吐等)。
8. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中有不良反

臺北市立



應紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。

9. 本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/  
藥師。