



藥物成分	劑型	櫃號
Valsartan	口服藥	

版本：TPE202309／檔號：2023-792

☞ 藥品商品名及含量

得安穩膜衣錠 160 毫克/錠 (Diovan F.C.)

利他穩膜衣錠 160 毫克/錠 (Divastan F.C.)

☞ 藥品作用

本藥為一種血管收縮素 II 受體拮抗劑，用於治療高血壓、心衰竭 (NYHA 二到四級)、心肌梗塞後左心室功能異常。

☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次 1 粒。
2. 請依醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是有腎臟、肝臟或其他心血管疾病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是糖尿病或腎功能不全患者，且正在服用含 aliskiren 成分藥品；cyclosporine、rifampin、ritonavir、保鉀利尿劑、鉀離子補充劑、非類固醇抗發炎止痛劑。
3. 請避免吃過量高鉀食品，若要使用低鈉鹽請事先諮詢醫師。
4. 常見副作用為頭暈、頭痛、姿勢性低血壓(坐臥姿變換站姿時易頭暈)、乾咳、腸胃不適等，但一般都不嚴重，若症狀嚴重或持續時請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：意識混亂，心跳不規律，呼吸急促、過敏反應(搔癢、蕁麻疹、喉頭腫脹)、水腫、排尿量改變。
6. 懷孕等級 D，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥分泌到母乳的量不明，哺乳期間不建議使用。