



藥物成分	劑型	櫃號
Acamprosate Calcium	口服藥	
版本：TPE202309／檔號：2023-503		

☞ 藥品商品名及含量

戒酒妥腸溶錠 333 毫克/錠 (Alglutol Delayed-Release Tablets)

☞ 藥品作用

1. 用途：酒精成癮戒斷之輔助治療。
2. 作用：降低酒精成癮者對酒精的渴望，並減少酒精攝入量；降低酒癮病人酒精復用的嚴重程度。

☞ 服用方式

1. 體重 60kg 以上：每日 6 粒，分成每日 3 次(每次 2 粒)，飯後服用。
2. 體重 60kg 以下：每日 4 粒，請配合醫師指示服藥。
3. 嚴重腎功能不全者($\text{CrCl} \leq 30 \text{ ml/min}$)**禁止**服用本藥物；中度腎功能不良($\text{CrCl} 31\text{-}50 \text{ ml/min}$)者需劑量減半。
4. **輕度至中度肝功能不全病人毋須調整劑量。重度肝功能不全病人則不建議使用戒酒妥腸溶錠。**
5. 建議在酒精戒斷症狀緩解之後再開始使用。
6. 大約在 5-8 天之後出現作用，連續使用 24 週，效果較佳。
7. 文獻建議治療時間為 6 到 12 個月。若欲繼續服用，可與醫師討論。
8. 本藥為腸溶錠劑型，不可嚼碎或剝半，會影響藥物療效。

☞ 注意事項

1. 若您有腎、肝、呼吸系統、心血管疾病、癲癇或其他慢性疾病，請告知醫生。
2. 若您同時服用其他藥物，請告知醫師您所服用之藥物種類。

3. 在確定藥物對你產生影響前(如頭暈等)，請勿從事需要專注力或協調的活動(如開車或操作危險器械)。
4. 如果使用阿坎酸期間復飲酒超過4週，需停止服用阿坎酸。
5. 極少數的病人會發生憂鬱情緒，或伴隨自殺意念，如有此狀況，請立即回診。
6. 最常見的副作用是腹瀉。少數病人初用本藥品時在前幾週內可能會有胃腸脹氣、噁心、口乾、皮膚搔癢症、流汗、頭暈、無力、焦慮、憂鬱、失眠、感覺異常等副作用。
7. 若您已懷孕(或計畫懷孕)或在哺乳，請告知醫師並與醫師討論。
8. 健保並不給付本藥費用，故須自費。