

藥物成分

劑型

櫃號

Nicotine

貼片

版本：TPE202309／櫃號：2023-315

☞ 藥品商品名及含量

淨菸經皮吸收戒菸貼片 10 號 (Smokfree TDDS)

淨菸經皮吸收戒菸貼片 15 號 (Smokfree TDDS)

☞ 藥品作用

藉由尼古丁貼片持續得補充尼古丁，有助戒菸者消除菸癮。

☞ 使用方式

1. 每日一片，於洗澡後貼至身體乾淨無毛髮處(如手臂、胸部或是腹部)，每天應更換黏貼位置，同一處皮膚應於至少一星期避免再進行黏貼使用。若使用期間有影響睡眠品質，可於早上進行黏貼，於睡前取下。
2. 使用時依箭頭指示將鋁箔袋撕開取出貼片，將透明塑膠襯墊中央波浪紋面朝上，從中央扳開塑膠襯墊。撕開襯墊後，將膚色面朝上進行黏貼，先固定一部分貼片，再撕開另一邊襯墊後，用力壓住 10 秒。貼 24 小時後，請取下貼片對摺丟棄。
3. 請依照醫師指示使用，不可自行調整劑量或增加次數。若不慎忘記，請立即補貼，但若已接近下一次時間，在下次用藥時間使用即可，不可為了補用而使用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 當使用本藥時，**絕對禁止吸菸**，以免造成尼古丁過量而發生中毒現象。
2. 本藥不宜長期使用(超過三個月)，因為有可能因過長時間吸收貼劑中的尼古丁而造成對尼古丁成癮。
3. 本貼片內含鋁箔材質，若於使用期間需要進行磁共振造影 (Magnetic Resonance Imaging, MRI) 檢查時，請於檢查前撕去本貼片，以避免於檢查過程中因過熱而造成皮膚灼傷。
4. 黏貼此貼片後，請馬上用清水洗手。
5. 水分不會影響此貼片作用，洗手或洗澡時不必撕下，但應

避免用力擦洗黏貼部位，以免脫落。若於使用期間脫落，可以立即更換黏貼新貼片，並於平常更換貼片的時間將其撕下。

6. 因為尼古丁具揮發性，若打開後放置太久將失去其效力，故應於取出貼片後立即使用，否則請保存在鋁箔袋中。
7. 可能於使用期間皮膚會有輕微的發癢、發熱或刺痛等現象，症狀應於 1 小時內就會消失。撕去本藥後，黏貼處的皮膚可能會稍微紅腫，於一天後紅腫即應消失，若有發疹或是紅腫現象嚴重時，請立即停止使用，並請告訴您的醫師。
8. 於懷孕期間應避免使用，尼古丁會影響胎兒健康，並已有臨床報告證實尼古丁的使用有致畸胎的風險。
9. 於哺乳期間尼古丁的使用尚無有效的證據說明餵哺期間對於嬰兒的風險，於哺乳期間使用此貼片，請請事先諮詢醫師/藥師。