



藥物成分	劑型	櫃號
Dabigatran	口服藥	

版本：TPE202309／檔號：2023-563

## ☞ 藥品商品名及含量

普栓達膠囊 110 毫克/膠囊 (Pradaxa 110mg)

普栓達膠囊 150 毫克/膠囊 (Pradaxa 150mg)

## ☞ 藥品作用

Dabigatran 是一抑制凝血酶預防血栓發生的藥物，可預防非瓣膜性心房纖維顫動病患發生中風與全身性栓塞。

## ☞ 服用方式

1. 通常每日 2 次，每次 1 粒，依醫師臨床判斷使用之。
2. 空腹或飯後服用均可，**必須將膠囊整顆吞服。請勿弄破、咀嚼、研磨或取出膠囊內藥粒**，因為均可能使藥物吸收量增加。
3. 請依醫師處方服藥，**本藥作為預防栓塞需長期定時服用**，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已在下一次服藥 6 小時內，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告知醫師或藥師您是否有藥物過敏或有其他疾病，特別是對此藥物過敏、**肝腎功能不全、心臟人工瓣膜置換、有出血風險的疾病**，6 個月內曾有出血性中風、**胃潰瘍病史**。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是：肝素、ketoconazole、cyclosporine、itraconazole、血小板凝集抑制劑、抗凝血劑、quinidine、amiodarone、verapamil、clarithromycin、dronedarone、ticagrelor 等。
3. **本藥易受潮，須存放於 30°C 以下之陰涼乾燥處，請使用前才將膠囊自鋁箔片(原包裝)中拿出。**
4. 常見副作用為**上腹部疼痛(胃痛)、腹瀉、消化不良及增加出血機率**，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回

診。若有異常瘀血或出血、流鼻血、牙齦出血等症狀，務必告知醫師。

5. 如果有下列症狀，尿液呈現粉紅色或棕色、糞便呈現紅色或黑色、咳血或吐血時、嚴重疼痛，請立刻就醫。
6. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。