

藥物成分

劑型

櫃號

**Irbesartan/
Hydrochlorothiazide**

口服藥

版本：TPE202309／櫃號：2023-242

☞ 藥品商品名及含量

可普諾維膜衣錠 300/12.5 毫克/錠 (CoAprovel)

☞ 藥品作用

本藥用來治療高血壓，且可治療併有第二型糖尿病患者的高血壓及糖尿病性腎病變。

☞ 服用方式

1. 每日 1 次，每次 1 粒。
2. 當覺得情況有改善時必須持續服用藥物，不能自行停藥；未經醫師指示不可自行調整劑量或增加服藥次數。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是肝腎疾病、心衰竭或心臟疾病、高膽固醇、糖尿病、排尿困難、痛風。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 aliskiren、鋰鹽、利尿劑、非類固醇抗發炎藥(NSAID)、毛地黃、Cholestyramine、降血糖藥、類固醇。
3. 併用酒精可能加重頭暈、疲倦現象。
4. 常見副作用為：頭痛、輕微腹瀉、便秘、噁心。但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：過敏反應(如搔癢、臉部或手部腫脹)、尿量改變、疲倦、暈眩、體重增加、關節水腫、異常皮膚腫塊或色差、視力異常。
6. 目前對胎兒的風險已有資料顯示有致畸胎的紀錄，女性

臺北市立

聯合醫院

計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。本藥分泌到母乳的
量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。