

## 藥物成分

## 劑型

## 櫃號

**Brompheniramine/  
Pseudoephrine**

**口服藥**

版本：TPE202309／櫃號：2023-073

### ☞ 藥品商品名及含量

**敵敏克必顆粒 1 克/包 (Histapp Granules)**

### ☞ 藥品作用

緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀(鼻塞、流鼻水、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢)。

### ☞ 服用方式

一日4次，每次間隔4小時以上服用。成人及12歲以上，每次1公克(1包)；6歲以上未滿12歲，每次0.5公克(1/2包)，3歲以上未滿6歲，每次0.25公克(1/4包)；3歲以下之嬰幼兒，請洽醫師診治，不宜自行使用。

### ☞ 注意事項

1. 曾因本藥成分引起過敏的人，請勿使用。
2. 服用單胺氧化酶抑制劑(MAOI)的人或停用 MAOI 兩星期內，不得服用本藥，如不了解服用之藥品是否含有 MAOI，請詢問醫師或藥師。
3. 有下列情形者，使用前請洽醫師診治
  - (1) 3 歲以下。
  - (2) 嚴重代謝性肝腎疾病的人。
  - (3) 曾診斷為下列疾病的人：心臟心病、高血壓、糖尿病、甲狀腺機能亢進、因前列腺肥大引起排尿困難。
  - (4) 有呼吸疾病的人：如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難，及青光眼的人。
4. 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生
  - (1) 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
  - (2) 65 歲以上。
  - (3) 服用鎮靜藥或安眠藥的人。
  - (4) 服用其他綜合感冒藥、鎮咳祛痰藥、鎮暈藥、鼻炎藥

或抗過敏藥等的人。

5. 其他使用上注意事項。

(1) 為防止兒童誤食請妥善保管。

(2) 避免陽光直射。

(3) 勿超過建議使用量。

(4) 不得與酒精性飲料併用。

(5) 可能引起嗜睡，勿駕車或操作危險性機械。

6. 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用：倦怠感、興奮、口乾、視覺上之困擾。

7. 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

(1) 若有任何不適情況產生。

(2) 連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

 藥品儲存

請於室溫 25°C 以下陰涼處貯存。