

藥物成分	劑型	櫃號
Fluticasone/ Vilanterol	乾粉 吸入劑	

版本：TPE202309 / 檔號：2023-600

☞ 藥品商品名及含量

潤娃易利達粉狀吸入劑 92 微克/22 微克/每定量
(Relvar Ellipta)

H 用藥指導短片




☞ 藥品作用

慢性阻塞性肺病和氣喘的維持治療。


☞ 使用方式

1. 需用藥時再打開蓋子，每日吸入 1 次。


勿遮蔽氣孔



1. 滑開紅色外蓋至聽到「卡搭」聲，即完成一次劑量之填充。




2. 先向旁邊盡量吐氣，請注意不要對吸嘴吹氣。




3. 嘴巴含住吸嘴，以長而穩定的方式深吸一口氣。
(深吸目的是要讓藥粉進入肺部深處，達到良好的治療效果)




4. 移開吸入器，閉住氣至少 3-4 秒鐘。



5. 慢慢吐氣。



6. 將紅色外蓋向上滑回原位即可。

2. 以乾面紙擦拭吸嘴即可(不可用水)，亦不需要常態性的清潔。
 3. 吸入劑瓶身有一個剩餘劑量的視窗，共含有 30 劑；當您的吸入器只剩下小於 10 劑時，計數器左邊會呈現紅色提醒您需要準備新的吸入器。
- 
4. 每次使用完吸入劑必須以清水漱口，且不可將水吞下，以降低發生口咽念珠菌病之風險。
 5. 每 24 小時不可使用超過一次。請依照醫師指示用藥，不可自行調整劑量或增加用藥次數。若不慎忘記用藥，請立即補用，但若已接近下一次用藥時間，在下次用藥時間用藥即可，不可為了補用而使用雙倍劑量。

∞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是有嚴重乳蛋白過敏問題、急性支氣管痙攣、活動性/非活動性肺結核。
2. 常見副作用為振顫、心悸、頭痛、聲音沙啞，口腔念珠菌感染等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
3. 如果有下列症狀，請立刻就醫：心跳過快、心律不整、癲癇發作、肌肉痙攣、支氣管痙攣。
4. 室溫儲存，自藥盒取出可存放 1 個月。
5. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中沒有致畸胎的紀錄 女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
6. 本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。