



藥物成分

劑型

櫃號

Upadacitinib

口服藥

版本：TPE202309 / 檔號：2023-442

☞ 藥品商品名及含量

銳虎持續性藥效錠 15 毫克/錠 (Rinvoq E.R.)

☞ 藥品作用

本藥為免疫抑制劑，用來治療類風濕性關節炎、乾癬性關節炎、僵直性脊椎炎、異位性皮膚炎。本藥尚有其他臨床用途，請詢問您的醫師或藥師。

☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次 1 粒。
2. 請完整吞服，不應剝半、攪碎或咀嚼。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是癌症、心肌梗塞、中風、肺栓塞、深層靜脈栓塞、帶狀疱疹、B 型肝炎病史。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是強效 CYP3A4 抑制劑: Clarithromycin、Erythromycin、Diltiazem、Itraconazole、Ketoconazole、Ritonavir、Verapamil 或是強效 CYP3A4 誘導劑: Carbamazepine、Phenobarbital、Phenytoin、Rifampin。
3. 服藥期間請避免吃葡萄柚或葡萄柚汁。
4. 可能的藥物副作用：咳嗽、上呼吸道感染、發燒、高血脂、發燒、噁心嘔吐，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：貧血、白血球低下、病毒感染、肺炎、栓塞。

臺北市立

6. 服藥期間應避免施打活性減毒疫苗，如水痘疫苗、麻疹-腮腺炎-德國麻疹疫苗、活性減毒型帶狀疱疹疫苗 Zostavax。

7. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中有傷害胎兒的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請務必告知您的醫師，本藥分泌到母乳的量不明，但考量嬰兒風險建議勿哺乳，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。