



藥物成分	劑型	櫃號
Desoximetasone	口內劑	

版本：TPE202309／檔號：2023-146

## ☞ 藥品商品名及含量

微笑口內膏 1 毫克/公克(Smile Orabase 0.1%)

親平口內膏 1 毫克/公克(Zine Orabase 0.1%)

## ☞ 藥品作用

糜爛或潰瘍伴隨口內炎或舌炎。

## ☞ 使用方式

使用前請先將手洗乾淨，擦乾，取少許口內膏(約 1 公分)塗抹於患處，使其完全覆蓋患處而成一薄層。若有數處損傷時，則用量可以增加。如症狀嚴重時每天需塗抹 2~3 次以達最佳療效。使用後暫勿飲水或進食，建議飯後或就寢前使用。

## ☞ 注意事項

1. 下列患者不宜使用：口腔結核性、濾過性病毒性或其他化膿性感染者。曾對本劑產生過敏症狀的患者。
2. 通常高齡患者較易出現副作用，因此大量或長期使用時應特別注意觀察。
3. 孕婦或可能懷孕婦女宜避免長期連用本劑。
4. 小兒長期連用可能產生發育之障害。
5. 若有發生臨床重要副作用/不良反應，請立即停止使用，並諮詢醫師或藥師：

(1) 口腔感染症：本劑治療中可能發生口腔之真菌性或細菌性感染。當出現此類症狀時，應併用適切之真菌劑及抗菌劑。如症狀仍無法迅速改善，則宜終止使用本劑。

(2) 過敏症：如有過敏現象產生時，宜中止使用本劑。

(3) 腦下腺—腎上腺皮質系機能：長期使用本劑可能產生腦下腺—腎上腺皮質系機能之抑制作用。

## ☞ 藥品儲存

請貯存於 25°C 以下，避光緊密容器中。