

藥物成分

劑型

櫃號

Zotepine

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-452

☞ 藥品商品名及含量

柔靈平糖衣錠 50 毫克/錠 (Zonin 50mg tab)

☞ 藥品作用

治療思覺失調症。

☞ 服用方式

1. 成人 1 日 75~150mg，分次口服。但可依年齡、症狀適宜增減之，一日量可增加至 450mg。
2. 未經醫師指示，請勿擅自更改劑量或停藥。

☞ 不良反應

嗜睡、無力倦怠感、失眠、口渴、便秘、眩暈

☞ 注意事項

1. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。
2. 對成分過敏請勿服用。
3. 因本藥與其他藥物有許多交互作用，會增加或減少多種其他藥物的濃度，請務必主動告訴您的醫療團隊，提供者您正在使用的所有藥物。若於治療期間需使用其他藥物，請主動告知醫師或諮詢藥師。
4. 服藥期間不要喝酒精性飲料。

☞ 其他注意事項

1. 可能會出現嗜睡，注意力、集中力、反射機能等降低之情形。所以對於正在服藥的患者，須注意勿從事開車等具有危險性的機械操作。
2. 有心臟病、青光眼、攝護腺腫大、排尿困難、癲癇病史、甲狀腺機能亢進及正在服用其他藥品者，請先告知醫師。

臺北市立

聯合醫院

3. 懷孕、計畫懷孕或哺乳者，請先告知醫師，服藥期間懷孕者請立即與醫師聯繫。