

## 藥物成分

**PEG 3350/KCL/  
NaHCO<sub>3</sub>/NaCl/  
Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>**

## 劑型

**口服  
粉劑**

## 櫃號

版本：TPE202309／檔號：2023-335

## ☞ 藥品商品名及含量

**腸見淨粉劑 (GI Klean Powder)**

## ☞ 藥品作用

用於大腸鏡檢查、手術前清腸。

## ☞ 服用方式

1. 檢查或手術前請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。
2. 每包粉劑以 1000 毫升常溫冷水泡製，攪拌至粉末完全溶解。每 10-15 分鐘喝 250 毫升。
3. 服藥後大約 60-90 分鐘左右開始排瀉，作用時間約 2-4 小時，惟因個人體質差異導致之排便時間延後，可藉由多走動、按摩腹部或用溫水沖洗刺激肛門，以加速腸道蠕動及排便。
4. 若使用本藥後 2 個小時沒有排便，請暫停使用，等排便後再繼續使用。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有其他疾病，特別是腸胃道阻塞、潰瘍、結腸炎、巨結腸症、腎臟疾病、心臟衰竭、腹水或需要限制鈉離子攝取的情況。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗凝血藥物及降血糖藥物。
3. 用藥前 2 小時請以流體食物 (如：茶、咖啡、運動飲料、無渣果汁及清湯) 為主，禁止服用牛奶、豆漿及固體食物。
4. 其他口服藥須於服用此藥前 1 小時服用。
5. 檢查前三天請務必進行低渣飲食(如：白吐司、稀飯、麵

條)，避免吃高纖蔬菜、水果、肉類、奶製品(如：牛奶、羊奶、奶酪、優酪乳)。

6. 常見副作用為噁心、腹脹、腹痛、嘔吐、肛門刺激感，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
7. 如果有下列症狀，請立刻就醫：直腸出血或劇烈腹痛。
8. 服用此藥後到檢查前，請盡可能多喝水以幫助排便及減少脫水現象。請分次喝足建議水量，一定要排瀉至糞水呈澄清透明色才算乾淨，若糞水還是黃橙色，請於禁水前繼續補充水分。
9. 多次排便容易造成肛門不舒服，建議在排便後用水沖洗肛門，不要用衛生紙擦拭。
10. 女性哺乳、計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。