



藥物成分	劑型	櫃號
Alogliptin/ Pioglitazone	口服藥	
版本：TPE202309／檔號：2023-018		

☞ 藥品商品名及含量

歐欣尼膜衣錠 25 毫克+30 毫克/錠 (Oseni)

☞ 藥品作用

本藥合併兩種作用互補且機轉不同的降血糖藥物，用於改善第二型糖尿病患者的血糖控制。

☞ 服用方式

1. 每日 1 次，每次 1 粒，隨餐或空腹後服用。
2. 必須整錠吞服，不可剝開。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病 特別是**心臟衰竭**、嚴重肝腎功能不全。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 gemfibrozil、nifedipine、topiramate、abiraterone acetate、ketoconazole、rifampicin、atorvastatin、ranitidine。
3. 常見副作用為鼻咽炎、背痛、上呼吸道感染、低血糖，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 如果有下列症狀請立刻就醫：心臟衰竭症狀（例如體重快速大幅增加、呼吸困難、水腫）、史蒂文生強生症候群（皮膚紅疹或嘴破，且合併類流感的症狀，像是發燒、顫抖、肌痛或噁心嘔吐等）、肝衰竭、過敏反應（急性過敏、血管水腫、皮疹、蕁麻疹）。
5. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中臨床資料不足，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。

臺北市立

6. 本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/

藥師。

TAIPEI CITY

TAINAN CITY HOSPITAL

HO

臺南市立醫院

臺南市立醫院

臺南市立醫院

臺南市立醫院

臺南市立醫院