



## 藥物成分

## 劑型

## 櫃號

**Amlodipine /  
Atorvastatin**

**口服藥**

版本：TPE202310／檔號：2023-022

## ☞ 藥品商品名及含量

脂脈優 5 毫克/20 毫克/錠劑 (Caduet Tablets)

克壓脂膜衣錠 5 毫克/20 毫克/錠劑 (Dualpress F.C. Tablets)

## ☞ 藥品作用

高膽固醇血症、高三酸甘油脂血症、高血壓。

## ☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次 1 粒。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是肝功能不全，以及 amlodipine/atorvastatin 過敏。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是其他心血管藥物、clarithromycin、ketoconazole、itraconazole、ritonavir。
3. 服藥期間請避免吃葡萄柚或葡萄柚汁。
4. 常見副作用為水腫、腹瀉、消化不良、頭痛、頭暈、腹痛、便秘，但一般都不嚴重，若症狀嚴重或持續時請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：不明原因的肌肉疼痛、壓痛或無力症狀
6. atorvastatin 禁用於懷孕女性，因為在懷孕女性中的安全性尚未確立，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。