



藥物成分

劑型

櫃號

Tegafur/Uracil

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-764

☞ 藥品商品名及含量

友復膠囊 100/ 224 毫克/膠囊 (Ufur)

☞ 藥品作用

在體內可轉換成 5-fluorouracil (5-FU)，是抗腫瘤劑，可用在胃癌、大腸(結腸直腸)癌、乳癌、與 Cisplatin 併用治療轉移及末期肺癌、頭頸部癌、用於病理分期 T2 之第一期 B 肺腺癌病人手術後輔助治療。

☞ 服用方式

1. 通常每日服用 2~3 次，每次 1~2 粒。
2. 請依醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是嚴重感染、水痘、嚴重消化道潰瘍、免疫性疾病、血液性疾病(如白血病或貧血)、糖尿病、或肝腎功能不良。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗病毒藥 sorivudine、抗癲癇藥 phenytoin、其他抗腫瘤藥、抗凝血劑 warfarin、放射線治療中。
3. 服藥期間請避免飲酒，酒精會增加肝臟的負擔與副作用。
4. 若長期使用建議定期檢測血球及肝腎功能。
5. 服藥期間若要施打活性疫苗請事先諮詢醫師。
6. 請確定他人不會碰觸或誤食這個藥品，尤其是孩童/孕婦/寵物；如須撥開膠囊管灌請諮詢藥師處理方式。
7. 服藥可能會使您的免疫力降低，若要出入公眾場所請戴口罩，避免接觸傳染病患者或污物，勿生食，注意個人衛生

避免受傷。

8. 常見副作用為厭食/嘔吐、腹瀉、口腔炎、腹痛、食道潰瘍、手掌/腳踝有皮膚炎/角化發生、倦怠或頭痛，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
9. 如果有下列症狀，請立刻就醫：皮膚/眼睛變黃、不明發燒/虛弱、皮膚發疹/紅斑、肺炎、胸悶或胸痛、不明的瘀血/出血、強烈腹痛、腹瀉不止、血/黑便、認知或行動障礙。
10. 孕婦不可使用，此藥有致畸胎的紀錄，若女性計畫懷孕請告知醫師；本藥禁止於哺乳期間使用。