



藥物成分	劑型	櫃號
Lansoprazole	口服藥	
版本：TPE202309／櫃號：2023-262		

☞ 藥品商品名及含量

逸潰定膠囊 30 毫克/膠囊 (Lansoprazole Capsules)

胃全膠囊 30 毫克/膠囊 (Rich Capsules)

泰克胃通 口溶錠 30 毫克/錠 (Takepron OD)

☞ 藥品作用

治療胃、十二指腸潰瘍、逆流性食道炎、

ZOLLINGER-ELLISON 症候群，合併抗生素治療與幽門螺旋桿菌相關消化性潰瘍。

☞ 服用方式

1. 使用劑量通常每日 1-2 次，每次 1 粒。
2. 逸潰定膠囊及胃全膠囊須整粒吞服。
3. 泰克胃通口溶錠不應嚼食。請將藥錠置於舌上待其分解後吞服，可喝水或不喝水。通常藥錠不到 1 分鐘便會溶解。
4. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 Sucralfate。
3. 如需與 Sucralfate 合併使用，請於服用 Sucralfate 30 分鐘前使用本藥品。
4. 服藥期間請避免吃葡萄柚、柚子或葡萄柚汁。
5. 常見副作用為腹瀉、腹痛、便秘、噁心、頭痛，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：過敏反應(皮疹、蕁麻疹或支氣管痙攣)，急性間質性腎炎(身體或四肢紅疹且發

7. 懷孕等級 B，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
8. 本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。