



藥物成分	劑型	櫃號
Clozapine	口服藥	
版本：TPE202309／檔號：2023-130		

- ∞ 藥品商品名及含量
- 克慮平錠 25 毫克/錠 (CLOPINE)。
 - 克慮平錠 100 毫克/錠 (CLOPINE)。
 - 可洛拉平錠 25 毫克/錠 (Mezapin)。
 - "優生"可樂平錠 100 毫克/錠 (USPEN)。

- ∞ 藥品作用
1. 其他藥物治療失效的思覺失調症病人。
 2. 降低思覺失調症或情感性分裂症的復發性自殺行為。
 3. 帕金森氏症期間的精神疾病。

- ∞ 服用方式
1. 本藥須由醫師處方使用。
 2. 劑量應隨個人而調整。治療對象必須嚴格限定於白血球數(WBC)，和絕對嗜中性細胞球數的數值在標準正常範圍內。
 3. 開始治療：第一天給予一次或兩次 12.5 mg(1/2 顆 25 公絲之錠劑)。若可承受則劑量可每天增加 25~50 mg，於 7~14 天內達到每天 300 mg 之劑量。總劑量可不平均分配，大部分的量於睡前服用。劑量超過每天 450 mg 時，應小心發生不良反應。
 4. 老年患者以特別低的劑量開始治療(第一天給予一次 12.5 mg)，並限制之後劑量的增加最多只能到每日 25 mg。對於兒童的安全性與藥效尚未被確定。
 5. 達到最佳治療效果後，能以較低的劑量有效地維持，小心地逐漸減少劑量。治療至少應持續六個月。如果每日劑量不超過 200 mg，可每日一次給藥，給藥時間可能在晚上會較適當。
 6. 計畫結束 Clozapine 的治療時，在一到兩個星期間逐漸降低劑量。如有必要突然停藥(例如因為白血球減少)，應謹慎地觀察是否有精神病症狀，以及與膽鹼類藥物反彈

相關的症狀，如大量出汗、頭痛、噁心、嘔吐、腹瀉。

7. 忘記服用一次劑量時，在想起後應儘快服用。如果到了下次劑量的服用時間，或距離下次服用時間少於4個小時，略過之前忘記服用的藥錠，並且在正確時間服用下一次劑量。
8. 不要服用雙倍的 Clozapine 劑量以彌補錯過的劑量。
9. 如果未服用 Clozapine 超過二天，請勿重新開始服用藥物，並且應儘快與醫師聯繫。

注意事項

1. Clozapine 會造成顆粒性白血球缺乏症。需定期接受白血球與絕對嗜中性細胞球計數檢查之安全規定。
2. 如果發生任何感染的現象，應立即與主治醫師聯絡。對於出現類似於感冒的症狀，如發燒、喉嚨痛、及其他可能表現出嗜中性白血球減少症之感染現象，應特別注意。
3. 服用此藥可能會降低體溫調節能力，要注意水分補充，避免過熱造成脫水現象。躺臥或坐姿起立時應緩和改變姿勢，以免造成眩暈、頭痛、或昏倒。
4. 如果在休息時感覺到心臟快速而不規則的跳動，可能還會伴隨著呼吸短促或足、腿的腫脹，請立刻諮詢醫師。
5. 有攝護腺肥大、抽搐、青光眼(一種眼睛中液體壓力過高的疾病)、糖尿病或其他嚴重的健康狀況，請告知醫師或藥師。
6. 不應飲酒。抽煙與咖啡因可能會影響藥物血液中的含量。
7. 懷孕或認為可能會懷孕，請在服藥之前告知醫師或藥師。治療期間懷孕，請立刻告訴醫師。
8. 如果正在哺乳，請告訴醫師或藥師。Clozapine 可能會進入分泌的乳汁而影響嬰孩。治療期間不應哺乳。
9. 某些服用抗精神疾病藥物的婦女，其生理週期會混亂或無月經。在這些狀況下，應該確認自己使用可靠的避孕方法。
10. 可能會導致睡意，特別是在治療開始時。所以應該避免駕駛或使用機器，直到已經習慣這種藥物，且不再造成困倦的情況。

藥品儲存：請於 25°C 以下避光儲存。