

藥物成分

劑型

櫃號

Methylprednisolone

口服藥

版本：TPE202309 / 檔號：2023-292

☞ 藥品商品名及含量

蒙治爽錠 4 毫克/錠 (Metisone)

敏疫朗錠 4 毫克/錠 (Methylone)

☞ 藥品作用

屬於皮質類固醇藥物，類似於人體腎上腺皮質所分泌的荷爾蒙，主要可減輕發炎反應，包括紅、腫、熱、痛，因此通常用在關節炎、過敏、氣喘、器官移植抗排斥和免疫失調等疾病。

☞ 服用方式

1. 通常一日 1~12 粒，分 1~4 次服用，實際用法用量請依醫師指示。
2. 建議飯後或與食物併服，以減低腸胃道副作用，如果 1 天服用 1 次，應在早上服用。
3. 療程完整性：治療期間必須在指定時間回診，不可自行停藥，長期服用的病人，須遵循醫師指示慢慢減低劑量。
4. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是對 methylprednisolone、aspirin、tartrazine(食物或藥物中的一種黃色染料)有過敏的反應、黴菌感染、其他感染症、麻疹、肝臟疾病、腎臟病、心臟疾病、血栓相關疾病、短期內做過心臟手術、甲狀腺機能不足、高血壓、糖尿病、電解質不平衡、重症肌無力症、骨質疏鬆、肺結核、潰瘍性結腸炎、胃潰瘍、白內障、青光眼。
2. 請主動告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是

特別是抗凝血劑 warfarin、aspirin、利尿劑、cyclosporin、phenytoin、penobarbital、rifampin。

3. 若長期使用，在施打疫苗前請告知醫師。
4. 常見的藥物副作用：失眠、皮膚變暗或變淺、外觀改變(例如：臉、手腳、軀幹浮腫)、胃口改變、腸胃不適、高血糖、血壓上升、頭痛、頭暈目眩、焦慮、情緒搖擺不定、粉刺、青春痘增加、月經週期改變等，一般都不嚴重，但若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：**皮膚紅疹、手腳及胸背骨骼痛、虛弱無力、糞便變黑、延遲傷口癒合、視力障礙等。**
6. 如有要開刀或拔牙，請事先告訴醫師或牙醫師或藥師您正在服用此藥。
7. 請避免或限制酒量，酒精會增加胃的刺激作用。
8. 目前對胎兒的風險不明，有致畸胎的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
9. 本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。