



藥物成分	劑型	櫃號
Loperamide	口服藥	
版本：TPE202309／櫃號：2023-281		

☞ 藥品商品名及含量

洛普拉膠囊 (樂必寧) 2 毫克/膠囊 (Loperamide)
依莫瀉膠囊 2 毫克/膠囊 (Imolex)

☞ 藥品作用

緩解腹瀉。

☞ 服用方式

1. 一般初劑量成人為 2 粒，五歲以上孩童為 1 粒，隨後依據腹瀉情形依照醫囑調整劑量。
2. 五歲以下孩童：醫師會依照體重給予適當的劑量。
3. 請依醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或疾病史，特別是腸胃蠕動異常。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物。
3. 少數人服用本藥可能會產生暈眩/嗜睡，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。
4. 服藥期間請避免飲酒過量，酒精可能會加重此藥暈眩/嗜睡的副作用。
5. 常見副作用為口乾、頭暈目眩、嗜睡、嘔吐、胃痛胃脹、便秘、疲勞，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：皮膚出疹、呼吸喘或困難。
7. 懷孕等級 B，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師。
8. 本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。