



藥物成分	劑型	櫃號
Gemtamicin	眼用藥	

版本：TPE202309 / 檔號：2023-610

☞ 藥品商品名及含量

紫菌素眼用藥膏 3 公絲/公克 5 公克/支 (Gemtamicin)

漸得明眼藥膏 3 毫克/公克 5 公克克/支 (Gendermin)

☞ 藥品作用



本劑適用於結合膜、角膜、眼瞼、淚腺與眼睛附近表面細菌感染疾病，如結膜炎、角膜炎、淚囊炎、瞼腺炎等眼部疾患。

☞ 使用方式

1. 一般每日 3~4 次於眼疾處。

眼藥膏使用步驟

1. 頭後仰或平躺，拉開下眼瞼
2. 眼睛朝上看，將藥膏塗抹在眼瞼上約 1/3 長度左右。
3. 藥物瓶口不可接觸眼睛，若擔心不易控制，也可先將藥膏塗在乾淨消毒的棉花棒再上藥。
4. 輕閉雙眼 2-5 分鐘。



2. 同時點眼藥水及眼藥膏時，應先點眼藥水，並最少 5 分鐘後再點眼藥膏。

3. 眼藥膏可在醫師指示下皮膚外用，使用後不可回擦眼睛。
4. 請依照醫師指示用藥，不可自行調整劑量或增加用藥次數。若不慎忘記用藥，請立即使用，但若已接近下一次使用時間，在下次用藥時間使用即可，不可使用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 眼藥開封後 1 個月未使用完畢即應丟棄。
2. 使用隱形眼鏡時，勿點眼藥水，除非經醫師允許。
3. 常見副作用為短暫的刺激感，但一般都不嚴重 若症狀惡



化且無法忍受請回診。

