



| 藥物成分 | 劑型 | 櫃號 |
|----------------------------|-----|----|
| Enzalutamide | 口服藥 | |
| 版本：TPE202309 / 檔號：2023-187 | | |

☞ 藥品商品名及含量

安可坦軟膠囊 40 毫克 (Xtandi)

艾納脈軟膠囊 40 毫克 (Anamide)

☞ 藥品作用

用於治療前列腺癌。

☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次 1 粒。應以水吞服整粒膠囊，不應咀嚼、溶解或打開，可隨餐或空腹服用
2. 切勿嚼食或打開膠囊服用，直接接觸膠囊內容物可能對口咽部黏膜造成刺激。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否對 enzalutamide 過敏或是其他疾病，特別是過去曾經痙攣發作、腦外傷、中風等。
2. 應避免與 warfarin 類抗凝血劑併用。
3. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 gemfibrozil、lurasidone、rifampicin 等。
4. 賦形劑含有 sorbitol，果糖不耐症的罕見遺傳疾病之病人不可使用本藥。
5. 本藥可能會讓人協調能力降低，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。
6. 常見副作用為無力、疲勞、頭痛、熱潮紅、高血壓。
8. 服用本藥期間及停藥 3 個月內，必須使用保險套及其他避孕措施。
9. 本藥禁用於女性及兒童。

臺北市立

10. 此藥具有胎兒毒性，懷孕或可能懷孕的女性不可以在沒有保護(例如手套)的情況下處理損壞或打開的 Xtandi 膠囊，亦不可由病人或其照顧者以外的人處理。