



藥物成分	劑型	櫃號
Thalidomide	口服藥	
版本：TPE202309／檔號：2023-773		

## ☞ 藥品商品名及含量

賽得膠囊 50 毫克/膠囊 (Thado)

## ☞ 藥品作用

本藥有免疫調節、抗發炎及抗血管新生等性質，可抑制腫瘤壞死因子過度產生。主要可用於治療新診斷多發性骨髓瘤。使用時須和 Prednisolone 及 oral melphalan 併用，或和骨髓移植併用，或和 pamidronate 併用骨髓移植後之治療。本藥尚有其他臨床用途，請詢問您的醫師或藥師。

## ☞ 服用方式

1. 通常每天 1 次，睡前或晚飯後至少 1 小時後，每次 4 粒，與水併服，每天最大劑量 400mg。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是心血管疾病(包含血栓栓塞病史)、癲癇、後天免疫缺乏症候群、白血球低下、肝功能不良病史。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在使用其他藥物，特別是 barbiturates 類鎮靜劑、chlorpromazine、reserpine、docetaxel。
3. 本藥可能會讓人睏倦/嗜睡或姿勢性低血壓，若從躺臥姿勢要起身站立時請緩慢避免暈眩，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械，服藥期間請勿飲用酒類。
4. 服藥期間請勿捐血或捐精。
5. 常見副作用為便秘、嗜睡、頭暈、水腫、姿勢性低血壓，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。

臺北市立

6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：皮膚剝落、皮膚紅疹或嘴破(合併類流感的症狀，像是發燒、顫抖、肌痛)、呼吸急促/困難、胸痛、手腳疼痛腫脹或刺痛、心跳異常、癲癇。
7. 懷孕等級 X，本藥有造成畸胎之紀錄，禁止用於懷孕婦女，治療期間及停止治療後四週應持續避孕；本藥分泌到母乳的量不明，服藥期間不建議哺乳。