



藥物成分	劑型	櫃號
Cephalexin 500mg	口服藥	
版本：TPE202309／檔號：2023-106		

☞ 藥品商品名及含量

賜福力欣膠囊 500 毫克/CAP (Cephalexin)

優力黴素膠囊 500 毫克/CAP (Ulexin)

☞ 藥品作用

葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症，例如泌尿生殖道、呼吸道、柔組織及皮膚等感染症。

☞ 服用方式

1. 成人：一次 250~500mg，每 6 小時一次。

2. 兒童：一天 25~50mg/kg，分四次使用。

☞ 注意事項

1. 對青黴素過敏的患者，使用頭芽孢菌素時，應特別小心，因為青黴素族與頭芽孢菌素族間可能具有部份交互過敏的性質(Cross-allergenicity)。

2. 如對本品發生過敏反應者，應該停止用藥，並立刻就醫治療。

3. 孕婦使用本劑的安全性尚未確定。

4. 腎功能有顯著損傷的患者，其安全劑量可能比一般建議劑量低，所以使用本劑時，應該配合仔細的臨床觀察。

5. 曾有腹瀉、噁心、嘔吐、消化不良及腹痛的報告，但均不致於達到須要停藥的程度。