



藥物成分

劑型

櫃號

Mineral oil

眼用藥

版本：TPE202309／檔號：2023-176

☞ 藥品商品名及含量

淚膜眼藥膏 (Duratears Sterile Oph Oint)

☞ 藥品作用



暫時緩解因眼睛乾澀所引起灼熱感與刺激感。

☞ 使用方式

通常每天1次，建議睡前使用。請依醫師指示，不可自行調整劑量或使用次數。

眼藥膏使用步驟

1. 頭後仰或平躺，拉開下眼瞼
2. 眼睛朝上看，將藥膏塗抹在眼瞼上約1/3長度(約1公分)左右
3. 藥物瓶口不可接觸眼睛，若擔心不易控制，也可先將藥膏塗在乾淨消毒的棉花棒再上藥
4. 輕閉雙眼2-5分鐘



☞ 注意事項

1. 同時點眼藥水及眼藥膏時，應先點眼藥水，並最少10分鐘後再點眼藥膏。
2. 平時請放置在陰涼避光處(25°C以下)保存，眼藥開封後1個月未使用完畢即應丟棄。若顏色有變化、顆粒/混濁沉澱物，或出現異味，不可再使用。
3. 本藥不適合配戴隱形眼鏡時使用，使用眼藥膏前請摘下隱形眼鏡。
4. 暫時性視力模糊可能會干擾開車或操作機械能力，在暫時性視力模糊改善前，請勿開車或操作危險機械。
5. 常見副作用為頭痛、眼睛刺激(灼熱與刺痛)、眼瞼發炎、眼睛癢、視力持續模糊。

6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：局部反應徵兆與症狀(眼瞼反應)與全身性過敏反應，包括血管性水腫、蕁麻疹及搔癢、皮疹、呼吸急促、罕見支氣管痙攣。
7. 目前仍無法完全排除對胎兒的風險，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
8. 本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。