



藥物成分

劑型

櫃號

Cilostazol

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-551

## ☞ 藥品商品名及含量

大塚普達錠 100 毫克/錠 (Pletaal)

大塚普達錠 50 毫克/錠 (Pletaal)

羅達錠 50 毫克/錠 (Loata)

欣行健錠 100 毫克/錠 (Pleya)

## ☞ 藥品作用

Cilostazol 有抗血小板凝集和血管擴張的作用。用於緩解間歇性跛行的症狀，如增加最大及無痛行走距離。

## ☞ 服用方式

1. 通常每日 2 次，建議空腹服用。於早餐及晚餐至少半小時前或飯後兩小時服用，每次 1~2 粒。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是狹心症、鬱血性心衰竭、心肌梗塞、出血性消化性潰瘍等。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗血小板藥物、抗凝血藥、巨環類抗生素、抗黴菌劑。
3. 服藥期間請避免吃葡萄柚或葡萄柚汁。
4. 如將進行開刀或拔牙手術，要記得告訴醫師或牙醫師您正在使用本藥品。
5. 因可能會產生暈眩感，在您未清楚可能對您造成的影響前，不要開車或操作危險機械。
6. 常見副作用為頭痛、頭暈、腹瀉、咽炎、周圍性水腫、消化不良等症狀，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受

臺北市立

聯合醫院

請回診。

7. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師或藥師。