



藥物成分

劑型

櫃號

Acetylcysteine

發泡錠

版本：TPE202309／檔號：2023-006

☞ 藥品商品名及含量

富泌舒痰發泡錠 600 毫克/錠 (Fluimucil A Effervescent Tablets)

愛克痰發泡錠 600 毫克/錠 (Actein Effervescent Tablets)

☞ 藥品作用

本品為呼吸道黏液溶解劑，透過分解黏蛋白複合物將分泌物從黏稠變為透明。此外，具有抗氧化作用，因此亦可為 acetaminophen 中毒解毒劑。

☞ 服用方式

1. 通常每日 1~2 次，每次 1 錠，請置於玻璃容器中**加水溶解後飲用**。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是支氣管哮喘。
2. 本品含甜味劑阿斯巴甜，因此苯酮尿症患者不適合使用。
3. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 nitroglycerin。
4. 不建議將其他藥品與本品溶液混合在一起。
5. 常見副作用為噁心、嘔吐，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：過敏反應(皮疹、支氣管痙攣)。
7. 女性哺乳、計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。