



藥物成分

劑型

櫃號

Terbinafine

口服藥

版本：TPE202309／流水號：2023-414

☞ 藥品商品名及含量

徽星平錠 250 毫克/錠 (Terfung)

徽特克舒錠 250 毫克/錠 (Fungitech)

☞ 藥品作用

甲癬、髮癬，嚴重且廣泛，經局部治療無效的皮膚黴菌感染。

☞ 服用方式

1. 通常為一天服用 1 次，空腹或飯後、隨餐均可服用。髮癬需治療 4 週；手指甲癬需治療 6 週；腳趾甲癬則要 12 週。因為健康指甲長出來需要一些時間，完成療程的數月後才能完全根除黴菌的感染部位。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師，您是否對 Terbinafine 或其他藥物有過敏的反應。
2. 請告訴醫師或藥師您正在服用的藥物，包含非處方藥、維他命、營養補充劑、中草藥，特別是 rifampicin 和 cimetidine，醫師將根據您的狀況來調整藥物的劑量或是密切監測副作用的發生。
3. 請告訴醫師或藥師，您目前或曾有過肝臟、腎臟疾病、人類免疫不全病毒(HIV)疾病或後天免疫缺乏症候群(AIDS)。
4. Terbinafine 導致的副作用並不常見，但還是可能發生，且是暫時性的。若有以下症狀發生嚴重的情形或是無法忍受，請盡快告知您的醫師：頭痛、飽脹、噁心、消化不良、腹痛腹瀉、沒有胃口、紅疹、關節痛、肌痛、茶色尿。

臺北市立

5. 孕婦用藥等級：B。若您已懷孕，就診時請務必告知醫師

並告知週數。若您計畫懷孕，就診時請務必告知醫師。

6. 本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。