

藥物成分

劑型


櫃號

**Beclomethasone
dipropionate/ Formoterol
fumarate dihydrate**


**乾粉
吸入劑**

版本：TPE202309 / 流水號：2023-048


- ☞ 藥品商品名及含量
肺舒坦耐舒樂乾粉吸入劑 100 微克及 6 微克/每劑
(Foster Nexthaler)
- ☞ 藥品作用
慢性阻塞性肺病或氣喘的長期維持治療。
- ☞ 使用方式
18歲以上成人通常每日2次，每次1~2劑。




檢查劑量計數器窗口，全新的吸入器計數窗顯示為120




拿起吸入器，並打開保護蓋至全開




先向旁邊盡量吐氣
(不可對口含器吐氣)



嘴巴含住吸口，
迅速深吸一口氣
(可能會有味道或是
有喀答聲)



移開吸入器，
閉住氣5-10秒鐘，
緩慢吐氣



將保護蓋完全蓋上，
並確認劑量計數器數字已減少1單位

注意事項

1. 請依醫師指示用藥，不可自行調整劑量，若不慎忘記用藥，請立即補用，但若已接近下一次用藥時間，在下次用藥時間用藥即可，不可為了補服而使用雙倍劑量。
2. 每次使用完吸入劑必須以清水漱口且不可吞下，降低發生鵝口瘡的風險。
3. 本藥含有吸入性類固醇可能影響免疫功能，若所在地區有暴露水痘/麻疹的風險請先諮詢醫師。
4. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏，特別是乳蛋白、本藥成分或任何賦形劑過敏。
5. 常見副作用為顫抖心悸、頭痛、口乾、咳嗽等，但一般都不嚴重，若症狀惡化無法忍受請回診。
6. 如果有下列症狀請立刻就醫：行為改變、易怒、呼吸困難、心律不整/嚴重心悸、視力變化(模糊/疼痛)、支氣管痙攣。
7. 現有證據對孕婦使用時胎兒風險不明確，本藥可能會分泌到母乳裡，女性計畫懷孕/哺乳或已懷孕請諮詢醫師/藥師。

清潔方式

請用乾面紙或布清潔吸口，不能用水清洗或放入水中。

儲存方式

室溫 30°C 以下儲存，平時應放置於保護袋內儲存，第一次打開保護袋後，藥品應在 6 個月內使用完畢。

如何觀測剩餘藥量

吸入器瓶身有一個剩餘劑量的視窗，共含有 120 劑，若劑量計數器窗口顯示為 0，請不要再使用此吸入器。

以下情況請勿使用 Nexthaler

1. 吸入器已超過保存期限
2. 自首次打開保護袋以來已超過 6 個月
3. 吸入器已損毀
4. 劑量計數器窗口顯示為「0」
5. 無法判讀劑量計數器窗口之數字。