



藥物成分	劑型	櫃號
<b>Cyproterone acetate</b>	<b>口服藥</b>	
版本：TPE202309／檔號：2023-468		

## ☞ 藥品商品名及含量

欣能錠 50 毫克/錠 (Synteron Tablets)

## ☞ 藥品作用

男性：嚴重性慾過強、抗雄性素治療前列腺腫瘤。

女性：嚴重的男性化徵狀、青春痘、多毛症。

## ☞ 服用方式

1. 男性性慾過強：開始治療時每天 2 次，每次 1 粒，依照醫師指示調整劑量。
2. 前列腺腫瘤：每次 2-3 粒，每天 2-3 次，依照醫師指示服用。
3. 嚴重的女性男性化症狀、青春痘、多毛症：請依照醫師指示服藥。
4. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 懷孕及哺乳之婦女不可服用本品，故在開始治療前要排除懷孕的可能。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 **Ulipristal**、**Metyrapone**、降血糖藥、**Statin** 類降血脂藥。
3. 酒精：酒精會降低此藥的作用。
4. 常見的藥物副作用：性慾降低、勃起障礙、排卵抑制、男性女乳症、疲勞、潮熱、流汗、藥物性肝損傷。
5. 本藥常引起男性乳房增殖，在停藥後通常會恢復。
6. 本藥會抑制女性排卵，故治療期間會不孕，可能會發生

乳房的腫脹感。

7. 如果有下列症狀，請立刻就醫：肝毒性(上腹部不適、倦怠、皮膚或眼睛發黃、茶色尿)、腦膜瘤徵兆(視力變化、聽力喪失或耳鳴、嗅覺喪失、隨時間惡化之頭痛、記憶力喪失、癲癇發作或四肢無力)、嚴重過敏症狀(皮膚搔癢、雙眼、嘴唇、舌頭或面部腫脹、呼吸困難、喉嚨發緊或吞嚥困難)。
8. 懷孕等級 D，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
9. 本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。
10. 本藥會引起疲倦、體力衰退而減少專注的能力，若需極大的專注力(如：開車、操作機器)者需留意。
11. 請置於緊密、避光的容器中，貯存於 30°C 以下。請置於小孩伸手不及處存放。