



藥物成分	劑型	櫃號
<b>Tramadol/ Acetaminophen</b>	<b>口服藥</b>	
版本：TPE202309 / 檔號：2023-782		

## ☞ 藥品商品名及含量

服安痛膜衣錠 37.5 毫克+325 毫克/錠 (Traceton F.C.)

妥美亭膜衣錠 37.5 毫克+325 毫克/錠 (Tramacet F.C.)

保寧緩釋錠 75 毫克+650 毫克/錠 (Wontran ER)

## ☞ 藥品作用

使用非鴉片類止痛劑無效的中度至嚴重性疼痛。

## ☞ 服用方式

1. 需要時，每 4~6 小時使用 1 次，每次 1~2 粒。每日最大極量為 8 粒。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是曾經對 acetaminophen、tramadol、或鴉片類藥物過敏、曾經對鴉片類藥物或酒精產生依賴性、單胺氧化酶抑制劑 (MAOIs) 停用不足 2 星期、肝功能不良。請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是其他含 acetaminophen 或鴉片類藥物、選擇性血清素回收抑制劑 (SSRIs)、抗偏頭痛藥物、BZD 類鎮靜安眠藥品或其他中樞神經抑制劑、MAOIs、linezolid、抗巴金森氏症藥物 selegiline 或 rasagiline、ritonavir、三環抗憂鬱劑 (TCAs)、dextromethorphan、sumatriptan、buspirone、lithium。
2. 本藥可能會讓人暈眩/嗜睡/警覺性降低，屬易跌倒藥品，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械，服藥期間需避免飲酒。

3. 常見副作用為便秘、噁心嘔吐、頭暈、頭痛、嗜眠、皮膚過敏反應，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。

4. 如果有下列過敏症狀，請立刻停藥就醫：過敏反應（臉、口及喉嚨腫脹、呼吸困難、蕁麻疹、搔癢以及嘔吐）、血清素症候群（躁動、幻覺、心跳過快、高血壓、體溫過高、噁心嘔吐、腹瀉）。

5. 資料顯示對人類胎兒可能有危險，懷孕第三期（7個月至出生）婦女應避免使用。女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師。

6. 本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。