



藥物成分	劑型	櫃號
<b>Omidenepag isopropyl</b>	<b>眼用藥</b>	
版本：TPE202309／檔號：2023-456		

## ☞ 藥品商品名及含量

愛倍力點眼液 Eybelis 0.002%

**Eybelis 0.002% 2.5ml oph soln (Omidenepag)**

## ☞ 藥品作用

治療隅角開放性青光眼和高眼壓症。

## ☞ 使用方式

1. 每天晚上一次，每次一滴至患眼。
2. 使用兩種眼藥水時，請隔開至少 5 分鐘後點藥。
3. 使用兩種眼藥(眼藥水與眼藥膏)時，請先使用藥水再使用藥膏；並請隔開至少 10 分鐘後點藥。
4. 請依醫師指示用藥，不可自行調整劑量或增加次數。若今日不慎忘記使用，在下次用藥時間記得使用即可，不可使用雙倍劑量，每隻患眼一天只可使用一滴眼藥水。

## ☞ 不良反應

頭痛、乾眼、黃斑水腫(常見於眼部植入人工水晶體者)、虹膜炎(輕微發炎)、畏光等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。

## ☞ 注意事項

1. 禁忌症為眼睛無水晶體或曾植入人工水晶體的病人及對其賦形劑過敏者。
2. 避光，未拆封藥品需儲存於 2~8°C 冷藏(冰箱)環境。開封後可於 30°C 以下保存一個月。
3. 限對乙型腎上腺素阻斷劑有禁忌、不適或使用效果不佳之病患使用。宜先以單獨使用為原則。
4. 療效不足可併用其他降眼壓藥，但不得並用前列腺素衍生物類之藥品(Tafluprost)

- 
5. 內含之 Benzalkonium chloride 可能使隱形眼鏡的顏色改變。配戴隱形眼鏡者應在使用此藥物前取下隱形眼鏡，用藥後至少 **15 分鐘** 才能再戴上。
  6. 使用此藥物後可能發生暫時性視力模糊或畏光，在症狀消失前不可駕駛或操作機械。
  7. 目前尚無 Eybeli 用於哺乳婦、孕婦之臨床資料，若臨床醫師經評估個別感染孕婦後研判使用之效益大於風險，經充分告知且病人同意下可使用。
  8. Omidenepag isopropyl 用於兒童及青少年的安全性及療效尚無臨床使用經驗。