



藥物成分

劑型

櫃號

**Formoterol  
fumarate**

**口服藥**

版本：TPE202309／檔號：2023-223

## ☞ 藥品商品名及含量

服莫喘錠 0.04 毫克/錠 (Formorol)

## ☞ 藥品作用

緩解支氣管氣喘、急慢性支氣管炎、氣喘性支氣管炎、肺氣腫之症狀，促進支氣管擴張，使呼吸道暢通。

## ☞ 服用方式

1. 成人通常一天一到兩次，每次 1-2 粒。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是甲狀腺機能亢進、高血壓、心肌梗塞、糖尿病或嚴重心臟或血管障礙。
2. 常見副作用為頭痛、水腫、暈眩、心悸、失眠、皮膚反應、高血糖、腸胃不適、肌肉僵直或顫抖、上呼吸道症狀等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
3. 如果有下列症狀，請立刻就醫：持續性心悸、胸痛或顫抖。
4. 目前對胎兒的風險不明，但/臨床資料不足，懷孕期間本藥對於子宮收縮劑具有抑制作用，必須列入考慮，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
5. 本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。