



藥物成分

劑型

櫃號

Etoricoxib

口服藥

版本：TPE202309 / 檔號：2023-589

☞ 藥品商品名及含量

伊托膜衣錠 60 毫克/錠 (Etor F.C.)

萬克適錠 60 毫克/錠 (Arcoxia)

☞ 藥品作用

骨關節炎與類風濕性關節炎之表徵與症狀的急慢性治療、治療急性痛風性關節炎、治療原發性經痛、治療僵直性脊椎炎。

☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次 1 粒。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是有缺血性心臟疾病、週邊動脈疾病、腦血管疾病、消化性潰瘍或肝、腎功能不全者。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗凝血藥 warfarin、rifampin、利尿劑、血管收縮素轉化酶抑制劑(ACEI)及血管收縮素 II 接受體拮抗劑(ARB)、鋰劑及阿斯匹靈。
3. 常見副作用為虛弱無力、疲倦、眩暈、下肢水腫、高血壓、消化不良、胃灼熱、噁心、頭痛、肝指數升高，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 如果有下列症狀，請立刻就醫：喉痛、口腔/黏膜潰爛、皮疹等症狀。
5. 懷孕分級:D，避免在懷孕期間使用，因其在懷孕期間使用可能造成胎兒異常，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。