



藥物成分

劑型

櫃號

Bethanechol

口服藥

版本：TPE202309 / 檔號：2023-056

☞ 藥品商品名及含量

胃可麗錠 25 毫克/錠 (Wecoli Tablets)

滯尿通 25 毫克/錠 (Bethanechol Tablets)

第三項商品未決標

☞ 藥品作用

減緩因手術、藥物或其他原因引起之排尿困難及膀胱無力。

☞ 服用方式

1. 通常一天服用三至四次口服使用，應**空腹服用**(飯前至少 1 小時或飯後 2 小時)以避免胃部不適。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或有其他疾病，如：氣喘、膀胱感染、癲癇、低血壓、心臟病、帕金森病、甲狀腺亢進、腸胃阻塞或胃潰瘍。
2. 為避免藥物交互作用，請務必主動告訴您的醫療團隊，提供您正在使用的所有藥物名稱。若於治療期間需使用其他藥物，請主動告知醫師或諮詢藥師。
3. 此藥物可能會導致暈眩，在您未清楚藥物可能對您造成影響前，不要開車或使用危險機械。
4. 酒精會加重此藥導致的嗜睡作用，服用期間**請勿飲酒**。
5. 常見副作用為：胃不舒服、口水增加、眩暈、噁心、嘔吐、冒汗或皮膚潮紅，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 懷孕等級 C。女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。