



藥物成分

劑型

櫃號

Amoxicillin

口服液

版本：TPE202309／檔號：2023-802

☞ 藥品商品名及含量

萬博黴素懸液用粉 25 毫克/毫升 60 毫升/瓶 (Amolin susp.)

☞ 藥品作用

本藥為盤尼西林類**抗生素**，用於治療因葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。

☞ 服用方式

配置懸浮液：

配製前請先**搖鬆粉末**。
再加**冷水**至瓶身側面刻度處一半處，充分搖晃混合。
再繼續加入冷水至**60 毫升刻度處**，完成後需整瓶放置**冰箱冷藏(2-8°C)**。

每次使用前須先**搖混均勻**再倒出單次劑量。



最後泡製刻度

第一次加水請加到一半左右，再進行搖晃混合

- 通常每日 2-3 次，每次間隔 8-12 小時，無需考慮飯前飯後皆可服用，兒童每日建議劑量，**25~50 mg/kg/day**，分**2~3 次口服使用**，依照體重與感染問題而有所調整。
- 請依醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

- 配置後請**冷藏保存最多 7 日**，剩餘藥品請攜回藥局回收。
- 即使症狀消失也請按醫囑確實完成療程頻率及天數，避免產生抗藥性。

臺北市立

3. 常見副作用為腹瀉、噁心或嘔吐，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。

4. 如果有下列症狀，請立刻就醫：皮疹、蕁麻疹、臉或手部腫脹、呼吸/吞嚥困難、血便、發燒。

5. 懷孕等級 B，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師。本藥分泌到母乳的量稀少，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。