



藥物成分	劑型	櫃號
Dioctahedral Smectite	口服藥	
版本：TPE202309／檔號：2023-159		

☞ 藥品商品名及含量

舒腹達口服懸液用粉劑 3 公克/包 (Smecta)

☞ 藥品作用

急性和慢性腹瀉的治療

☞ 服用方式

1. 2 歲(含)以上的兒童：每日 2-3 袋。每日劑量分 3 次服用。
2. 成人：每日 3 袋，分成 3 次。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 不宜併用如 quinidine、disopyramide 類之鹼性藥品。
2. 藥袋的內容物於使用前，才將其混合成懸浮液。
3. 若為兒童，藥袋內容物應倒入奶瓶中和 50 ml 的水混合，並於一天內分次給予，或與半流體食物混合，如肉湯、果泥、菜泥、嬰兒食品。
4. 若為成人，藥袋內容物可與半杯水混合請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是肝臟或心臟方面疾病（心律不整）。
5. 本品之橘子香草口味，含有葡萄糖和蔗糖。不建議使用於有果糖不耐受症、葡萄糖和半乳糖吸收不良症候群或蔗糖酶/異麥芽糖酶缺乏症。
6. 本品的吸附性質可能干擾其他物質的吸收時間及/或速率，因此建議其他藥品應避免與舒腹達同時服用（盡可能間隔 2 小時以上）。

臺北市立

聯合醫院

7. 舒腹達 (Smecta) 並非補充體液療法，所以不能替代補充體液療法，脫水病患應適當補充體液。過量使用可能導致嚴重便秘或結石。