



藥物成分	劑型	櫃號
Cholestyramine	口服粉劑	

版本：TPE202309／檔號：2023-116

☞ 藥品商品名及含量

可利舒散 9 克/包 (Choles Powder)

☞ 藥品作用

本藥為膽酸結合樹脂，用來減少血中膽固醇濃度、改善膽酸過量沉積於皮膚所引發之搔癢、治療膽酸吸收不良引起之腹瀉。

☞ 服用方式

1. 請配合醫師指示服藥，如果對此藥有任何疑問，應詢問醫師或藥師。未經醫師指示不可自行調整劑量或增減服藥次數。
2. 服用時將粉末加入 120 – 180 毫升的液體，如水、果汁或其他飲料中，混合均勻後服用，不可直接服用粉末。
3. 若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 對藥物成分過敏，或膽管完全阻塞者，不可使用本藥。
2. 若須服用其他藥物，要至少在服用本藥 1 小時以前，或 4 – 6 小時以後，避免干擾其他藥品吸收。
3. 此藥會影響 Digoxin、Ezetimibe 的藥效，若有服用，請告知醫師/藥師。
4. 為防止兒童誤食請妥善保管。
5. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
6. 目前對胎兒的風險不明，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師。
7. 不會分泌到母乳中，但可能會影響哺乳婦女的維生素吸收，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。