



藥物成分	劑型	櫃號
Temozolomide	口服藥	
版本：TPE202309 / 檔號：2023-767		

☞ 藥品商品名及含量

- 帝盟多膠囊 100 毫克/膠囊 (Temodal)
- 帝盟多膠囊 20 毫克/膠囊 (Temodal)
- 特莫斯膠囊 100 毫克/膠囊 (Tamos)
- 特莫斯膠囊 20 毫克/膠囊 (Tamos)

☞ 藥品作用

具有抗腫瘤活性，可用於輔助性治療新診斷的多型性神經膠母細胞瘤，與放射治療同步進行，或用於給予標準治療後復發性或惡化之惡性神經膠質瘤。

☞ 服用方式

1. 本藥依腫瘤類型而有不同療程，劑量根據體表面積計算，通常每天服用 1 次，請依醫師指示的劑量和治療週期服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。
2. 請空腹服用本藥，至少在飯前 1 小時。
3. 本藥不可打開、嚼碎，需以一杯水整粒吞服。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是對本藥或化療藥 dacarbazine 過敏、嚴重骨髓抑制、懷孕、肝腎功能受損的病人。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗癲癇藥品 valproic acid。
3. 常見副作用為噁心、嘔吐、頭痛、疲倦、發燒、無力、便秘、腹瀉和嗜睡，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 如果有下列症狀，請立刻就醫：感染、出血。
5. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中有致畸胎的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。女性及男性在治療期間建議採取避孕措施至停藥 6 個月後。
6. 本藥分泌到母乳的量不明，服藥期間不建議哺乳。