



藥物成分

劑型

櫃號

Cetirizine

口服液

版本：TPE202309／櫃號：2023-549

☞ 藥品商品名及含量

勝克敏液 1 毫克/毫升 60 毫升/瓶 (Cetirizine Oral sol'n)

"約克"敏樂治內服液劑 1 毫克/毫升 60 毫升/瓶

(Minergy Oral Solution 1 mg/mL Y.K.)

☞ 藥品作用

一種抗組織胺劑，可用來治療季節性鼻炎、過敏性鼻炎、結膜炎、蕁麻疹、過敏性搔癢等過敏現象。

☞ 服用方式

1. 成人及 6 歲以上孩童：通常每日 1 次，每次 10 毫升。3~6 歲孩童：通常每日 1 次，每次 5 毫升；或每日 2 次，早晚各服用 2.5 毫升。臨床上常依體重作衡量，請依醫師或藥袋指示給藥。
2. 若所需服用水劑大於 5 毫升，可使用小量杯給藥；若小於 5 毫升，使用針筒、滴管或口服餵藥器較為準確。
3. 若使用小量杯測量藥液，請確保測量時眼睛與刻度平視。
4. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病。
2. 常見副作用為嗜眠、口乾、頭痛等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
3. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中沒有不良反應的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請先諮詢醫師/藥師。