



藥物成分	劑型	櫃號
Sennosides	口服藥	
版本：TPE202309／檔號：2023-390		

## ☞ 藥品商品名及含量

清立飄糖衣錠 12.5 毫克/錠劑 (Sennapur S.C.Tablets)

便通樂膜衣錠 20 毫克/錠劑 (Through F.C. tablets)

## ☞ 藥品作用

緩解便秘。

## ☞ 服用方式

1. 每日 1 次，每次 1~2 粒，於睡前或空腹時服用。未滿 12 歲 12 歲兒童使用，請依醫師指示劑量使用。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是腸胃道阻塞。
2. 請告訴醫師或藥師您正在服用的藥物，特別是制酸劑、抗生素、止痛藥、抗癲癇藥、抗憂鬱劑、心臟用藥或降血壓藥物和維他命。
3. 本藥不應長期使用，應盡量以含纖維飲食，充分攝取水份及運動來改善便秘。
4. 可能會使酸性尿呈黃、棕色，鹼性尿呈粉紅或紫紅色；且會使結腸黏膜變黑。
5. 本藥作用緩慢，約在服用後 8-10 小時後產生緩瀉效果。
6. 常見副作用為腹瀉、電解質不平衡、噁心、嘔吐、嚴重腹痛、皮膚紅癢、發疹等過敏反應，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
7. 如果有下列症狀，請立刻就醫：腹瀉持續不止或更嚴重、

有血便及自發性腸胃道出血狀況、使用一星期後無效、有任何不適情況發生。

8. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中沒有不良反應，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
9. 本藥分泌到母乳的量稀少，有需要哺乳請事先諮詢醫師或藥師。