



藥物成分	劑型	櫃號
Desoximetasone	外用藥膏	

版本：TPE202309／檔號：2023-145

## ☞ 藥品商品名及含量

華興去敏軟膏 2.5 毫克/公克 (Chemin ointment 0.25%)

## ☞ 藥品作用

濕疹、牛皮癬、燒傷、晒傷、昆蟲咬傷等皮膚感染症。

## ☞ 使用方式

每日二次塗敷於患部。

## ☞ 注意事項

1. 長期連續或不當使用局部皮質類固醇類藥品會導致停止治療後出現反彈性發作(局部類固醇戒斷反應)。嚴重反彈性發作範圍可能超出初始治療部位，其症狀可能以皮炎伴有強烈發紅、刺痛和灼熱感，特別使用於臉部和彎曲區域等較為嬌嫩皮膚部位時更容易發生。如果在治療成功後數天至數週內再次出現上述症狀，應懷疑可能為反彈性發作。另如需重新使用局部皮質類固醇類藥品，請謹慎評估其臨床效益與風險，或考慮改以其他治療方案替代。
2. 本劑只供外用，避免塗抹於眼部及患部以外的區域。
3. 治療處不要使用繃帶或其他覆蓋物。
4. 大面積的治療或長期使用時，會經皮膚吸入而系統性吸收產生 HPA (Hypothalamic -pitutary-adrenal)抑制反應。
5. 如發現皮膚有新病變，須立即請教醫師。
6. 孕婦避免使用。
7. 本藥會由乳汁分泌，授乳婦慎用。
8. 10 歲以下小孩安全性未確立，應慎用。
9. 若有發生臨床重要副作用/不良反應，請立即停止使用，並諮詢醫師或藥師：
  - (1) 皮膚和皮下組織疾病-戒斷反應(頻率未知)：皮膚發紅，可能會蔓延超出初始治療區域，灼熱或刺痛感，搔癢，皮膚脫屑，滲膿。

臺北市立

聯合醫院

(2) 有一般類固醇引起之局部不良反應報告：燒灼感、癢感、刺激感、乾燥感、毛囊炎、多毛症、口腔皮膚炎、過敏性接觸性皮膚炎、皮膚浸潤、二次感染、皮膚肥大、條紋、疹子。

(3) 臨床上有低色素反應之報告。

## ∞ 藥品儲存

儲存於 25°C 以下。