



藥物成分

劑型

櫃號

Fusidate

外用藥膏

版本：TPE202309／檔號：2023-606

☞ 藥品商品名及含量

膚若新乳膏 2% 5gm/支 (Fulosin)

☞ 藥品作用

治療皮膚細菌感染症，例如：葡萄球菌、鏈球菌或其他對 fusidic acid 敏感的細菌。

☞ 使用方式

1. 通常每日 2~3 次。適量塗抹於患部。
2. 不可使用於眼部。
3. 請依照醫師指示用藥，不可自行調整劑量或增加用藥次數。若不慎忘記用藥，請立即使用，但若已接近下一次使用時間，在下次用藥時間使用即可，不可使用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗生素、類固醇。
3. 長期使用可能導致雙重感染(包括真菌感染)。如果發生重複感染，請停止使用，請立即就醫重新評估和治療。
4. 常見副作用為皮膚刺激、發癢，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：患部發紅、腫脹、發疹。
6. 女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。