



藥物成分	劑型	櫃號
Lurasidone	口服藥	
版本：TPE202309／檔號：2023-283		

☞ 藥品商品名及含量

樂途達錠 80 毫克/錠(Latuda 80mg tablet)。

☞ 藥品作用

治療思覺失調症以及第一型雙極性疾患之鬱症發作。

☞ 服用方式

1. 起始劑量是每天一次，與食物併服，第一型雙極性疾患之鬱症發作每次 20 毫克，思覺失調症每次 40 毫克。經過充分時間讓效果完全發揮後，由醫師評估可將劑量提高。
2. 肝腎功能不佳的患者，醫師會斟酌為您減量使用。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是心臟相關疾病、肝病、腎臟病、糖尿病或曾經發生癲癇及藥物相關不良反應者。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是強力 CYP3A4 抑制劑(如：ketoconazole、clarithromycin、ritonavir、voriconazole、mibefradil)及強力 CYP3A4 誘導劑(如：rifampin、avasimibe、St. John's wort、phenytoin、carbamazepine)。
3. 服藥期間請避免吃葡萄柚或葡萄柚汁。
4. 請勿飲用酒類，酒精會增強此類藥物作用。
5. 本藥品可能造成姿勢性低血壓，為減緩頭暈現象，服藥期間宜緩慢起立或起床，尤其是開始治療、重新開始治療或增加劑量時。
6. 本藥可能會讓人暈眩/嗜睡/警覺性/協調能力降低，在還沒

確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。

7. 本藥可能降低體溫調節能力，高溫場所或劇烈運動宜多加留意，適度補充水分，避免體溫過高，而出現頭暈、虛弱、疲倦、嘔吐等不適。
8. 常見副作用為：噁心、嘔吐、腹瀉、嗜睡、焦躁不安，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
9. 如果有下列症狀，請立刻就醫：呼吸困難、起疹、嘴巴、舌頭或下巴等不受控制動作、出現傷害自己或其他人的想法/行為、血糖異常增高、體重快速增加。
10. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中沒有不良反應的紀錄，但應考慮在懷孕第三期接觸抗精神病藥物的新生兒在分娩後有錐體外和/或戒斷症狀的風險，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
11. 本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。