



藥物成分	劑型	櫃號
Estradiol ethinyl + Norgestrel	口服藥	
版本：TPE202309／櫃號：2023-193		

☞ 藥品商品名及含量

溫不妊 T/28 膜衣錠 (Winstop T/28 F.C.)

Estradiol ethinyl 0.03 mg, Norgestrel 0.05 mg 6 粒

Estradiol ethinyl 0.04 mg, Norgestrel 0.075 mg 5 粒、

Estradiol ethinyl 0.03 mg, Norgestrel 0.125 mg 10 粒、
安慰劑 7 粒

☞ 藥品作用

口服避孕藥。

☞ 服用方式

1. 請依照藥片背後順序指示於月經來潮的第五天開始服用第 1 粒，每日 1 次，飯後或睡前服用皆可，但請每天相同的時間服用，直到整包服完。不管月經是否已停止，當服完第一包藥的最後 1 粒，必須於次日接著服用第二包，依照指示從第 1 粒開始，不要間斷。
2. 如果忘記在正常的時間服藥，想起則應儘速補服，如果相較正常時間延遲 12 小時以上不須補服，惟仍需繼續依照正常時間服用其餘藥粒，同時兼採其他避孕法搭配藥粒 7 天（週期法或體溫法除外）。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是乳癌、性器官癌症、血栓靜脈炎或肺栓塞病史、嚴重肝疾病。
2. 菸癮大(每天抽 15 根以上)、35 歲以上、長年使用口服避孕藥者使用前請和醫師討論。
3. 因本藥與其他藥物有許多交互作用，會增加或減少多種其他藥物的濃度，請務必主動告訴您的醫療團隊，提供者您正在使用的所有藥物。若於治療期間需使用其他藥物，請

主動告知醫師或諮詢藥師。

4. 如果有下列症狀，請立刻就醫：過敏反應(皮膚疹)、劇烈頭痛或第一次發生偏頭痛、急性視力障礙、血壓上升、黃疸症。
5. 長期使用應每 6 個月進行婦科檢查。
6. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中有致畸胎的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
7. 本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師