



藥物成分	劑型	櫃號
Phenytoin/ Phenobarbital	口服藥	

版本：TPE202309 / 檔號：2023-696

☞ 藥品商品名及含量

樂安錠 50 毫克+20 毫克/錠 (L.A.)

☞ 藥品作用

1. Phenytoin 作用於腦部/神經系統可治療多種類型的癲癇。
2. Phenobarbital (俗名:巴比妥)，可控制癲癇或作為鎮靜劑來緩解焦慮、短期用來治療失眠。此藥也可能用於治療其他病症，請詢問您的醫師或藥師以獲得更多相關資訊。

☞ 服用方式

1. 通常每日 3 次，每次 1 錠。
2. 即使您已感覺好轉，仍應繼續服用此藥；**未經醫師同意前，不可自行停用此藥**，尤其是已經服用大劑量一段時間後；突然停藥可能導致抽搐，醫師可能會逐漸降低劑量。
3. **請依醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數**。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥，在下次用藥時間服藥即可，不可為補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是酒精、安眠劑、鎮靜解焦慮劑、抗凝血劑(warfarin)、口服避孕藥、類固醇、三環抗憂鬱劑(imipramine)、抗癲癇藥。
3. 請勿飲用酒類，酒精會增強此類藥物的作用。
4. **本藥可能會讓人暈眩、嗜睡使警覺性及協調能力降低，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。**
5. 常見副作用為頭昏、頭痛、食慾不振、嗜睡，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. **如果有下列症狀，請立刻就醫：昏迷、喘不過氣、呼吸及吞嚥困難、皮膚過敏現象。**

臺北市立

7. 妊娠投與本劑有畸型發展報告，故妊婦及可能懷孕之婦女應確認其有益性大於危險且經醫師同意後才能使用。本藥會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。