



藥物成分

劑型

櫃號

Fluticasone

鼻噴劑

版本：TPE202309 / 檔號：2023-601

H 用藥指導短片



藥品商品名及含量

艾敏釋鼻用噴液懸浮劑 27.5 微克/劑量
(Avamys Nasal Spray)


藥品作用

本藥用於治療 2 歲以上兒童、青少年與成人的過敏性鼻炎，可減緩鼻黏膜的發炎反應，改善鼻塞、流鼻水、鼻子癢、打噴嚏。

使用方式


1. 僅供鼻腔內途徑使用，通常每日 1 次，兩邊鼻孔各噴 1~2 下。

第一次使用艾敏釋鼻噴劑之準備



1. 蓋上塵蓋，並將鼻噴劑用力搖勻大約十秒鐘。


2. 用拇指和食指輕輕按壓塵蓋兩邊，直立取下塵蓋。




3. 垂直拿着鼻噴劑，並把噴嘴向外。緊實地按壓按鈕，並重覆至少 6 次，直到空中出現一團微細的噴霧。

鼻噴劑之使用步驟

1. 用力搖勻鼻噴劑。
2. 取下塵蓋。



3. 擤清鼻孔，然後頭稍微向前傾。
垂直拿着鼻噴劑，將噴嘴小心地放進其中一邊鼻孔。噴嘴末端稍微向外，離開鼻中隔，有助藥物達到鼻孔內正確部位。



4. 用鼻吸氣時，請緊實地按壓一次按鈕。小心不要讓藥物噴進眼睛，若發生此情況，請用清水沖洗眼睛。

5. 移出噴嘴，並用口呼氣。

6. 若每邊鼻孔必須噴 2 次，請重覆步驟 4 至 6。

噴藥於另一邊鼻孔時，亦請重覆步驟 4 至 6。

7. 將塵蓋蓋回鼻噴劑。

2. 每次使用之後皆需清潔，請勿用水清潔，用乾淨的乾紙巾來擦拭噴嘴和塵蓋內面後，蓋上蓋子。

3. 如果您認為噴嘴可能被堵塞，請勿使用別針或任何利器來清潔。

4. 如何觀測剩餘藥量：透過窗格內的液體水平檢查是否仍有剩餘藥物，若液體水平太低，剩餘藥物可能不足以讓鼻噴劑正常運作。

5. 請依照醫師指示用藥，不可自行調整劑量或增加用藥次數。若不慎忘記用藥，請立即補用，但若已接近下一次用藥時間，在下次用藥時間用藥即可，不可為了補用而使用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是口服類固醇、ritonavir。

1. 常見副作用為流鼻血、頭痛、鼻潰瘍等，症狀一般不嚴重，若症狀惡化，請回診就醫。

2. 若鼻子有痛處、動過手術或受傷，傷口癒合前請勿使用。

3. 若超過 30 天未使用或是 5 天以上未加蓋，請先測試按壓數次，直到均勻霧氣噴出後才可使用。
4. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示鼻用建議劑量之全身性暴露量很小，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
5. 本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師 / 藥師。