

藥物成分

劑型

編號

Sulpiride

口服藥

版本：TPE202309／流水號：2023-406

☞ 藥品商品名及含量

舒復寧膜衣錠 200 毫克/錠 (Sulpin)

舒立寧錠 200 毫克/錠 (Surin)

適潰瘍錠 50 毫克/錠 (Splotin)

思邁蒂膜衣錠 50 毫克/錠 (Sulmatyl)

☞ 藥品作用

1. 緩解相關精神症狀，如幻聽、妄想等。
2. 治療腸胃道潰瘍。

☞ 服用方式

1. 通常一天服用一到三次，每次一錠，此藥必須規律的服用幾個星期後才會感受到很好的藥效。
2. 請遵照處方使用，勿自行增減藥量或停藥。
3. 忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師，您是否對 sulpiride 或其他藥物過敏。
2. 請告訴醫師或藥師，您目前或曾有過的疾病，如：心血管疾病、低血壓、腎障礙。
3. 疑似有嗜鉻細胞瘤的患者，因為有引發血壓急劇上升的危險，請勿服此藥。
4. 此藥可能導致嗜睡，請儘可能不要開車或使用危險機械。
5. 酒精會增加此藥的嗜睡作用，服藥期間請勿飲酒。
6. 若有以下症狀發生嚴重的情形或是無法消除時，請盡快通知您的醫師：口渴、胃灼熱、噁心、嘔吐、便秘、睡眠障礙、不穩、焦躁、嗜睡、興奮、帕金森氏症候群、不自主運動、靜坐困難。
7. 女性若已懷孕或計劃準備懷孕，或在服藥期間懷孕，就診時請務必告知醫師。若您需要給嬰兒餵母乳，就診時請務必告知醫師。