



藥物成分

劑型

櫃號

Norfloxacin

口服藥

版本：TPE202309／櫃號：2023-319

☞ 藥品商品名及含量

滅菌樂爾膜衣錠 100 mg/tab(Baccidal)

☞ 藥品作用

表淺性皮膚、泌尿道、腸道感染。

☞ 服用方式

1. 通常每次 1-2 粒，一日 3-4 次。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是腎功能不良。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物。
3. 常見副作用為噁心、胃痙攣、暈眩、頭痛、發疹，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 如果有下列症狀，請立刻就醫：肌腱疼痛、肌腱發炎、嚴重過敏反應(皮疹、蕁麻疹或口腔破皮脹痛)。
5. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中臨床資料不足，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
6. 本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。