



藥物成分

劑型

櫃號

Domperidone

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-166

## ☞ 藥品商品名及含量

**Dosin 10mg tablet 道喜錠 10 毫克**

**Emetrol 10mg tablet 癉吐寧錠 10 毫克**

## ☞ 藥品作用

噁心、嘔吐的症狀治療，糖尿病引起的胃腸蠕動異常。

## ☞ 服用方式

1. 建議飯前及睡前 15~30 分鐘服藥，成人及青少年(大於 12 歲且體重超過 35 公斤)：每次 1 粒，每日最多 3 次。
2. 12 歲以下兒童及 12 歲以上體重小於 35kg 之青少年：每次每公斤 0.25mg，每日最多 3 次。
3. 請遵照醫師處方之用法及劑量服用，未經醫師同意，切勿自行增加藥量或服藥次數。

## ☞ 注意事項

1. 腎功能不良者應依醫囑謹慎使用。
2. 對成分過敏者、有顯著電解質異常或原有心臟疾病，如鬱血性心衰竭者應避免使用。
3. 避免同時使用制酸劑或抑制胃酸分泌的藥品，可能引發腸胃痙攣。
4. 患有釋出泌乳激素腦下垂體腫瘤(Prolactinoma)或服用 Ketoconazole 口服藥品之病人不宜使用。
5. 因本藥與部分藥物有交互作用，會增加或減少其他藥物的濃度，請務必主動告訴您的醫療團隊，提供者您正在使用的所有藥物。若於治療期間需使用其他藥物，請主動告知醫師或諮詢藥師。
6. 可能的藥物副作用：口乾、口渴、暫時性皮炎或搔癢、頭痛、腸胃不適、腹瀉、嗜睡等。罕見泌乳激素濃度升高、男性女乳症。為確保療效，若症狀輕微請勿停藥，無法忍受副作用時請回診告知醫師。